

## غیر نسخہ شدہ کوڈ 19 ٹیسٹ Quidel™ QuickVue At-Home کے متعلق بدایات

فود اینڈ ٹرگ ایڈمنیسٹریشن (FDA) نے یہ ٹیسٹ بنگامی استعمال کے اختیار کے تحت بغیر نسخے کے 14 سال یا زیادہ عمر کے افراد کے ذاتی طور پر ناک سے بنریعہ روئی کی پھربری کے برائے راست حاصل کئے گئے نمونوں کے ساتھ گھر میں استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ اس ٹیسٹ کو بغیر نسخے کے 2 سال یا زیادہ عمر کے افراد کیاۓ بالغ شخص کے بنریعہ ناک سے بنریعہ روئی کی پھربری کے حاصل کئے گئے نمونوں کے ساتھ گھر میں استعمال کرنے کی بھی اجازت دی گئی ہے۔

ٹیسٹ کرنے سے قبل، اپنے باتھوں کو صابن اور پانی سے دھوئے یا جراثیم کش محلول hand sanitizer کو استعمال کیجیئے۔ یہ امر یقینی بنائیے کہ آپ کے باٹھ مکمل طور پر خشک ہوں۔

### • مرحلہ نمبر 1: ٹیسٹ کٹ کا سازوسامان رکھئے

- ٹیوبس (ٹیوب کے اندر مانع ہے)
- ٹیوب بولڈر
- روئی کی پھربری
- ٹیسٹ اسٹریپس

### • مرحلہ نمبر 2: ٹیوب کو ٹیوب بولڈر میں رکھئے

- ایک ٹیوب سے ڈھکن ٹھایئے
- ٹیوب کو ٹیوب بولڈر میں رکھئے

### • مرحلہ نمبر 3: نتھنوں میں روئی کی پھربری لگائیں

- روئی کی پھربری کو اس کے غلاف سے نکالیئے (پھربری کے سرے کو مت چھوئے)
- روئی کی پھربری کو آپستنگ سے نتھنوں میں  $\frac{1}{4}$  سے  $\frac{4}{4}$  انچ اندر لے جائیں
- روئی کی پھربری کو نتھنے کی اندرونی سطح پر گردشی حرکت میں کم از کم 4 مرتبہ مضبوطی سے ملینے یا رکڑینے۔
- دوسرے نتھنے میں بھی روئی کی اس پھربری سے یہی عمل دوبارہ نہیں۔

### • مرحلہ نمبر 4: روئی کی پھربری کو ٹیوب میں رکھئے

- روئی کی پھربری کو فوری طور پر ٹیوب کے اندر مانع میں رکھئے (یہ بات یقینی بنائیے کہ یہ ٹیوب کی تہ کو چھوڑ بھی سکے)
- پھربری کو 3 سے 4 مرتبہ گھمانیں
- روئی کی پھربری کو محلول میں ایک منٹ کیلئے چھوڑ دیجیئے۔

### • مرحلہ نمبر 5: ٹیوب سے روئی کی پھربری کو نکالیں

- ایک منٹ کے بعد، روئی کی پھربری کو ٹیوب میں سے اس کے سرے کو ٹیوب کی اندرونی دیوار سے رکڑتے ہوئے مانع کو ممکنہ حد تک نچوڑتے ہوئے نکالیں
- روئی کی پھربری کو ردی کی ٹوکری میں ضائع کر دیجیئے۔

### • مرحلہ نمبر 6: ٹیسٹ اسٹریپ کو کھولیں

- ٹیسٹ اسٹریپ کی تھیلی کو چاک سے احتیاط سے کھولیں اور ٹیسٹ اسٹریپ کو ایسے پکڑیں جیسا کہ دکھایا گیا ہے۔

### • مرحلہ نمبر 7: اسٹریپ کو ٹیوب میں رکھئے

- ٹیسٹ اسٹریپ کو ٹیوب میں اس طرح رکھیں کہ اسٹریپ پر بنے ہوئے تیرنیچے کی جانب ہوں
- اسٹریپ کو ٹیوب میں پورے دس منٹ کیلئے چھوڑ دیجیئے اور ٹیسٹ اسٹریپ کو نہ چھوڑیں اور نہ نکالیں۔

### • مرحلہ نمبر 8: ٹیسٹ اسٹریپ کو ٹیوب سے نکالیں

- 10 منٹ کے بعد، ٹیسٹ اسٹریپ کو ٹیوب سے نکالیں
- ٹیسٹ اسٹریپ کو ایک ہموار سطح پر رکھیں

ایک مثبت ٹیسٹ نتیجہ دونوں نیلی لکیر اور گلابی لکیر دکھائے گا۔ نیلی لکیر کنٹرول لائن ہے اور گلابی لکیر ٹیسٹ لائن ہے۔

ایک منفی ٹیسٹ نتیجہ صرف نیلی لکیر دکھائے گا اور گلابی لکیر نہیں دکھائے گا۔

ایک غلط ٹیسٹ نتیجہ یا توکونی لکیر نہیں دکھائے گا یا صرف گلابی لکیر دکھائے گا۔ ٹیسٹ کو شروع سے نئی ٹیوب ، روئی کی نئی پھریری اور نئی ٹیسٹ اسٹریپ کو استعمال کرتے ہوئے دوبارا جائے۔

ٹیسٹنگ کے ساز و سامان کو ردی کی ٹوکری میں پہنچا جاسکتا ہے۔ تمام کارروائی مکمل کرنے کے بعد پاتھوں کو دھوئیے یا جراثیم کش محلول استعمال کیجیئے۔

ٹیسٹ کا عملی مظاہرہ دیکھنے کیاے ملاحظہ کیجیئے: [https://quickvueathome.com/#video\\_howitworks](https://quickvueathome.com/#video_howitworks)

ٹیسٹ کی مزید معلومات کیاے ملاحظہ کیجیئے: Quidel™ QuickVue At-Home OTC COVID-19

<https://quickvueathome.com/>