

이 치료 및 예방에 대한 부모 또는 보호자의 책임

귀 자녀는 살아있는 이가 있는 것으로 확인되었습니다. 부모 또는 보호자는 이를 치료하고 이의 재발을 방지하는 데 중요한 역할을 합니다. FCHD 웹사이트 <https://www.fairfaxcounty.gov/health/schools>에서 이에 대해 설명해 주는 브로셔를 확인하십시오.

이가 있다는 징후(예: 가려움증)가 나타나지 않더라도 가정 내 모든 인원의 머리카락을 확인하십시오. 귀하도 다른 사람에게 확인을 받으십시오!

연방 식품의약국(FDA)이 승인한 이 퇴치용 치료제는 살아있는 이가 있는 사람에게만 사용해야 합니다. 만 2세 미만의 아동 및 임신 또는 수유 중인 여성은 담당 의료 제공자와 상담하여 치료 조언을 받으십시오.

첫 번째 치료 후 학교 보건실에서 배부한 이 치료 확인서를 작성하십시오. 귀 자녀가 다시 등교할 때 해당 서류를 자녀가 다니는 학교의 보건실에 도로 제출하십시오.

귀 자녀와 밀접 접촉한 사람의 부모/보호자에게 귀 자녀가 이가 있다는 사실을 알려주십시오.

뜨거운 물과 열풍 건조기를 이용하여 의복, 침구 및 부드러운 소재의 장난감을 세탁하십시오(최소 20분간). 세탁 불가능한 물품은 비닐 봉지에 담아 14일간 밀봉해야 합니다.

진공 청소기로 카펫, 가구 커버 및 차량 좌석을 청소하십시오. 집 안에서 살충제를 사용하지 마십시오.

매일 가정의 모든 빗과 솔을 소독한 다음 뜨거운 물로 씻으십시오. 소독은 빗과 솔을 FDA가 승인한 이 퇴치용 샴푸에 1시간 동안 담그거나, 5~10분간 물에 끓임으로써 진행됩니다.

첫 번째 치료 후 상자 또는 라벨에 표기된 지침에 따라 자녀를 격리하십시오. 두 번째 이 치료 확인서를 자녀가 다니는 학교의 보건실에 도로 제출하십시오.

이의 알(서캐)을 제거하기 위해 첫 번째 치료 후 14일간 **매일** 서캐 전용 빗으로 자녀의 머리카락을 확인하면서 빗어 주십시오.

최소 2~3주 동안 2~3일마다 자녀의 머릿속을 계속 확인하십시오.

모든 단계를 따랐는데도 귀 자녀에게 여전히 살아있는 이가 있다면 담당 의료 제공자에게 연락하여 조언을 받으십시오.

모든 치료 단계를 따르는 데 도움이 되도록 "이 치료용 달력"을 사용하십시오.

이 치료용 달력

<p>1일차</p> <p>1. FDA가 승인한 이 퇴치용 치료제를 사용하십시오. 제품 라벨에 표기된 대로 지시사항을 정확하게 따르십시오.</p> <p>2. 의복, 침구 및 부드러운 소재의 장난감을 세탁하십시오. 세탁 불가능한 물품은 비닐 봉지에 담아 14일간 완전히 밀봉하십시오.</p> <p>3. 밀접 접촉자에게 상황을 알리십시오.</p> <p>4. 귀 자녀가 다니는 학교의 보건실에서 이 확인서를 받으십시오. 치료가 끝나면 이 서류를 작성하십시오.</p>	<p>2일차</p> <p>작성한 이 확인서를 자녀가 다니는 학교의 보건실에 도로 제출하십시오.</p> <p>어떤 종류의 샴푸로도 자녀의 머리카락을 씻지 마십시오.</p> <p>자녀의 머리카락을 적신 후 머리카락 가닥을 작은 부분 여러 개로 나누십시오. 이 알(서캐) 전용 빗을 사용하여 자녀의 머리 전체를 빗어 주십시오.</p>	<p>3일차</p> <p>일반 샴푸를 사용하여 자녀의 머리카락을 씻으십시오.</p> <p>전날의 지침에 따라 서캐 전용 빗으로 자녀의 머리카락을 빗어 내십시오.</p>	<p>4일차</p> <p>일반 샴푸를 사용하여 자녀의 머리카락을 씻으십시오.</p> <p>서캐 전용 빗으로 자녀의 머리카락을 빗어 내십시오.</p>	<p>5일차</p> <p>일반 샴푸를 사용하여 자녀의 머리카락을 씻으십시오.</p> <p>서캐 전용 빗으로 자녀의 머리카락을 빗어 내십시오.</p>	<p>6일차</p> <p>일반 샴푸를 사용하여 자녀의 머리카락을 씻으십시오.</p> <p>서캐 전용 빗으로 자녀의 머리카락을 빗어 내십시오.</p>	<p>7일차</p> <p>일반 샴푸를 사용하여 자녀의 머리카락을 씻으십시오.</p> <p>서캐 전용 빗으로 자녀의 머리카락을 빗어 내십시오.</p>
<p>8일차</p> <p>일반 샴푸를 사용하여 자녀의 머리카락을 씻으십시오.</p> <p>서캐 전용 빗으로 자녀의 머리카락을 빗어 내십시오.</p>	<p>9일차</p> <p>첫 치료 후 9~10일이 지났을 때, 또는 상자나 라벨에 표기된 지침에 따라 FDA가 승인한 이 퇴치용 치료제로 자녀에게 두 번째 치료를 실시하십시오.</p> <p>서캐 전용 빗으로 자녀의 머리카락을 빗어 내십시오.</p>	<p>10일차</p> <p>작성한 이 확인서를 자녀가 다니는 학교에 도로 제출하십시오.</p> <p>어떤 종류의 샴푸로도 자녀의 머리카락을 씻지 마십시오.</p> <p>서캐 전용 빗으로 자녀의 머리카락을 빗어 내십시오.</p>	<p>11일차</p> <p>일반 샴푸를 사용하여 자녀의 머리카락을 씻으십시오.</p> <p>서캐 전용 빗으로 자녀의 머리카락을 빗어 내십시오.</p>	<p>12일차</p> <p>일반 샴푸를 사용하여 자녀의 머리카락을 씻으십시오.</p> <p>서캐 전용 빗으로 자녀의 머리카락을 빗어 내십시오.</p>	<p>13일차</p> <p>일반 샴푸를 사용하여 자녀의 머리카락을 씻으십시오.</p> <p>서캐 전용 빗으로 자녀의 머리카락을 빗어 내십시오.</p>	<p>14일차</p> <p>일반 샴푸를 사용하여 자녀의 머리카락을 씻으십시오.</p> <p>서캐 전용 빗으로 자녀의 머리카락을 빗어 내십시오.</p> <p>이 모든 단계를 수행한 후에도 여전히 살아있는 이 또는 이의 알이 보인다면 반드시 담당 의료 제공자에게 연락해야 합니다.</p>